


Wątroba jednorodna, normoechogeniczna. Obraz żył wątrobowych oraz głównych naczyń wrotnych wątroby jest prawidłowy. Płat prawy w linii środkowoobojczykowej - wymiar AP 96 mm, długość płata prawego w linii sr. obojczykowej MCL = 102 mm, jest w normie. Pęcherzyk żółciowy bez złożeń, cienkościennej. Trzustka - widoczna w zakresie głowy i trzonu - bez zmian jej echostruktury. Okolica wpustu i odźwiernika obraz prawidłowy, pasaż żołądkowo-dwunastniczy zachowany, **Śledziona** jednorodna o długości 112 mm, nieco powiększona, wydłużony dolny biegun.

Nerki długość prawej 85 mm, lewej 87 mm. Zróżnicowanie korowo-rdzeniowe i miąższowo-zatokowe zachowane, W obu nerkach bez poszerzenia UKM. Pola nadnerczowe - symetryczne, obraz prawidłowy. Pęcherz moczowy - o ścianach gładkich, zawiera ok 90 ml bezechowego moczu // Widoczne pojedyncze węzły chłonne krezkowe 14- 15 mm w osi długiej. Perystaltyka jelit jest prawidłowa. Trzon macicy, 26 x 8 mm (wymiar AP = 8 mm,) endometrium niewidoczne, norma dla wieku.



W okolicy kąta żuchwy po str. prawej widoczne węzły chłonne do 22 x 7 mm, po lewej 24 x 8 mm z widoczną wnęką oraz prawidłowym, odwnękowym przepływem w opcji CD / .

Węzły chłonne wzdłuż przedniego brzegu MOS 14 mm. Ślinianki podżuchwowe oraz przyuszne o właściwej echogeniczności. W obrębie ślinianek przyusznych prawidłowe węzły wewnętrzne o długości do 6 mm.

TARCZYCA normoechogeniczna, bez zmian ogniskowych. Płat prawy objętość = 2,0 ml / płat lewy objętość 1,5 ml. Łącznie v tarczycy = 3,5 ml, norma dla wieku. **Grasica** - o typowej echostrukturze i właściwej lokalizacji. Migdałki podniebienne o średnicy ok 20 mm, w górnej granicy normy..

